

Synthèse trajet de soins insuffisance rénale chronique

Critères d'inclusion	» Avoir une insuffisance rénale chronique définie par <ul style="list-style-type: none"> • une vitesse de filtration glomérulaire calculée $<45\text{ml/min/1,73m}^2$ selon la formule MDRD simplifiée, confirmée une 2^{ème} fois après au moins 3 mois et/ou <ul style="list-style-type: none"> • une protéinurie de $> 1\text{gr/jour}$ confirmée une 2^{ème} fois après au moins 3 mois <p style="text-align: center;">+</p> » être âgé de plus de 18 ans » ne pas être en dialyse ni transplanté » être capable d'un follow-up ambulancier	
Autres conditions	» Le patient, le médecin généraliste et le spécialiste signent le contrat lors d'une consultation » DMG chez le médecin généraliste qui signe le contrat (au plus tard dans l'année) » Au moins 2 consultations chez le généraliste et 1 consultation chez le spécialiste par an	
Objectifs	» Organisation de la prise en charge et du suivi du patient » Collaboration optimale entre médecin généraliste, spécialiste et autres dispensateurs de soins » Meilleure compréhension par le patient de sa maladie et du suivi » Optimisation de la qualité des soins	
Honoraires médecin généraliste et spécialiste	Honoraire forfaitaire de 80 EUR/an	
Ticket modérateur patient	Remboursement complet (honoraire INAMI) de toutes les consultations chez le généraliste et le spécialiste de la maladie	
Données à enregistrer	Diagnostic rénal ¹ , tension artérielle, hémoglobine, créatinine, eGFR, parathormone	
Mesures de soutien pour le patient	Quoi ?	Conditions
Matériel	Tensiomètre validé	Prescription du généraliste avec mention : "trajet de soins insuffisance rénale chronique"
Consultation diététique	» Stade 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m ²) : 2 fois par an » Stade 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m ²) : 3 fois par an » Stade 5 (GFR $<15\text{ ml/min/1,73m}^2$) : 4 fois par an	Prescription du généraliste avec mention : "trajet de soins insuffisance rénale chronique"
Accès aux médicaments	Dans une phase ultérieure, l'accès à certains médicaments spécifiques sera adapté pour les patients qui suivent un trajet de soins.	

¹Diabète de type 1, diabète de type 2 avec ou sans biopsie, vasculaire sans diabète, glomérulopathie avec ou sans biopsie, néphropathie polycystique autosomale dominante, autre, inconnu.

